

Documentación del Proveedor: Insuficiencia Cardíaca Congestiva

Consejos y prácticas recomendadas de documentación

¿Sabía que la documentación completa de la insuficiencia cardíaca congestiva puede ayudar a identificar a pacientes para programas de manejo de enfermedad?

Hay que documentar estos elementos clave:

- Etiología de insuficiencia cardíaca congestiva (es decir, enfermedad arterial coronaria, valvulopatía, cardiomiopatía, cardiopatía hipertensiva).
- Tipo y agudeza de la insuficiencia cardíaca (siempre que sea posible), como estas:
 - Insuficiencia ventricular izquierda
 - Sistólica, diastólica o combinada sistólica y diastólica
 - Aguda, crónica o crónica reagudizada
- Cualquier afección adicional o secundaria, y cualquier relación causal que exista entre estas (por ejemplo, enfermedad renal crónica).
- Presencia de implantes e injertos cardíacos y vasculares, estado del trasplante, y cualquier complicación relacionada.

Utilice el método MEAT (Monitor, Evaluate, Assess, Treat, que en español significa monitorear, evaluar, valorar, tratar) para abordar de forma específica las condiciones del paciente:

| Monitorear | Evaluar | Valorar | Tratar |
|---|---|--|--|
| Signos Síntomas Progresión de la enfermedad Regresión de la enfermedad | Resultados de las pruebas Efectividad de medicamentos Respuesta al tratamiento Resultados del examen físico | Prueba solicitada Asesoramiento Revisión de registros Diálogo | Medicamentos Terapias Referencia Otras modalidades |
| Ejemplos de MEAT: Insuficiencia cardíaca congestiva | | | |
| Enfermedad renal crónica hipertensiva, etapa 4, con insuficiencia cardíaca: Se deberá monitorear la función renal con Lasix y revisar el perfil metabólico básico (BMP) en 2 semanas. | Insuficiencia cardíaca congestiva: Crónica La hinchazón en los tobillos bilaterales está mejorando; se seguirá con Lasix. | Insuficiencia cardíaca diastólica debido a enfermedad arterial coronaria: Se confirmó con resultados de electrocardiograma (ECG) reciente. Se habló sobre cirugía de bypass coronario. | Insuficiencia cardíaca sistólica aguda y crónica: Se suspenderá la hidroclorotiazida (HCTZ) y se comenzará con Lasix 40 mg diarios. Referencia al programa de insuficiencia cardíaca congestiva (CHF). |